

CONTROL BIOLOGICO DEL NEMATODO BARRENADOR (*Radophus similis*) DEL TALLO EN MUSACEAS

\

Carlos Anibal Montoya Marmolejo
I.A. MSc. Gerente y Representante Legal
SANOPLANT

Palmira , Agosto 14 del 2024

VOLCAMIENTO POR LOS NEMATODOS



ALCALDÍA DE PALMIRA
SECRETARÍA AGROPECUARIA
Y DE DESARROLLO RURAL




NEMATODO BARRENADOR DEL CORMO

Radopholus similis




NEMATODOS FITOPATÓGENOS



Morfología y tamaños relacionados de algunos de los más importantes Nematodos parásitos de plantas

NEMATODO BARRENADOR DEL CORMO

Radopholus similis




LESIONES A NIVEL DE RAICES

Radopholus similis




COLONIZACION DE *Rodopholus similis* A NIVEL CELULAR COMO ECTOPARASITO


Rodopholus similis
Posturas



**colonizando parénquima y
mostrando formación de cavidades**





**Hembra migrando Intracelularmente
la corteza de la raíz**



MATERIALES Y MÉTODOS

Activacion de la Patogenicidad

Producto comercial
Ingrediente activo
Conidias de *Paecilomyces lilacinus*
1x10⁸ conidias/ml





NEMATODO CONTROL BIOLÓGICO

Paecilomyces lilacinus

Beauveria bassiana

Metarhizium anisopliae





MUCHAS GRACIAS

I.A. M.Sc.CARLOS ANIBAL MONTOYA MARMOLEJO
GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL

CONTACTOS: 312 866 5646 – (602) 2844067
E-MAIL: carlosanibal.montoya@gmail.com

www.sanoplant.com.co